


# TOMICLES 50PM

## FUNGICIDA

CONTENIDO NETO: 500GR



### PRINCIPIO ACTIVO

Procimidone....50% p/v  
Formulación: Polvo Mojable  
Grupo Químico: Dicarboximida

### GENERALIDADES, MODO DE ACCI N SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO

Fungicida con actividad sistémica que luego de aplicado en raíces, tallos, ramas y hojas es absorbido y translocado a las partes superiores de las plantas. Recomendado en el control preventivo y curativo de enfermedades producidas por Hongos tales como: Botrytis cinerea y Monilia spp.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	100 g/100 lt ó 2 kg/ha
Aplicar al comienzo de la enfermedad durante la floración y el envero.-(*)			
Cebolla	Mancha blanca	Botrytis cinerea	1,5 kg/Ha
Aplicar a la aparición de los primeros síntomas y repetir a los 7 a 10 días.-(*)			
Frutilla	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	100 gr/100 lts
Aplicar desde el comienzo de la floración a la aparición de los primeros síntomas y repetir a los 7 a 10 días.-(*)			
Duraznero	Podredumbre morena	Monilia fructicola	75 gr/100 lts
Efectuar una o dos aplicaciones a la aparición de los primeros síntomas en el período comprendido entre botón rosado y caída de pétalos.-(*)			

(\*) No aplicar mas de dos a tres veces por temporada.

**Momento de aplicación:** Llenar el tanque del equipo hasta la mitad de su capacidad, poner a funcionar el retorno o los agitadores, agregar el producto y completar la carga de agua. No detener el retorno o los agitadores en ningún momento. El producto preparado debe ser usado dentro de las 24 hs. Aplicar con equipos convencionales terrestres, pastillas del tipo cono hueco. En caso de atomizadoras, la reducción del volumen de agua /ha; debe acompañarse con la concentración consecuente del producto, de tal manera de mantener la dosis /ha tratada. Prohibido llenar las máquinas con agua directamente cañadas o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones terrestres a menos de 300 m de zonas urbanas o suburbanas. Aplicaciones aéreas a menos de 500 m de cualquier zona urbana o suburbana. No realizar aplicaciones terrestres c/ maquinarias autopropulsadas o de arrastre a una distancia inf. a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes sup. No realizar aplicaciones aéreas a una dist. Inf a 30 m de corrientes de agua natural o sup.

**Compatibilidad y fitotoxicidad:** No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina. No tiene buena compatibilidad con órgano fosforados. En caso de duda hacer una prueba en pequeña escala para probar su compatibilidad con otro fitosanitario, así como su fitocompatibilidad. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. Si las recomendaciones se contradicen con las establecidas en la etiqueta no efectuar la mezcla.

### TIEMPO DE ESPERA

Vid, Cebolla, Durazno y Pelón: 25 días  
Frutilla: 30 días. En caso que el cultivo o sus subproductos estén destinados a la exportación deberán tenerse en cuenta lo Límites Máximos de Residuos (LMR) del país de destino y el tiempo de espera que corresponda a ese valor de tolerancia.

### TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO

No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado. (24 horas)

### OTRAS INFORMACIONES NECESARIAS RESPECTO AL USO

Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas sobre el mismo cultivo, puede producirse aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicho cultivo. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

**Toxicidad: Categoría IV**

**Antídoto: No posee antídoto.**

POCO PELIGROSO EN SU USO NORMAL IPCS/OMS 2009

### PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

### EQUIPOS DE PROTECCI N PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACI N Y APLICACI N

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

### INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, en lugar seco y seguro (bajo llave).
- El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros productos similares. El local debe estar claramente señalizado.
- Perforar las bolsas vacías para evitar su reutilización.

### PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de ingestión:** NO provocar el vómito  
**En caso de contacto con los ojos:** Lavar con agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.  
**En caso de contacto con la piel:** Lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar.  
**En caso de inhalación:** Retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

### ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCI N DEL MEDIO AMBIENTE

Prácticamente no tóxico para aves y abejas, moderadamente tóxico para peces. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas c/ este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosas para los peces.

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS
- EN CASO DE INTOXICACI N LLAMAR AL CIAT TEL: (2)1722
- CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACI N EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

"Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

Fabricación Extranjera  
Registro N°: 2406  
Fabricado / Exportado N.E.F.C. CO LTD.  
Importa y Distribuye: TOMAI LTDA.  
Fecha de Vencimiento: 11/2025  
N° Lote: 20231115

**Uso Agrícola - Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.**

El Fabricante N.R.C. Garantiza que las características físicas - químicas del producto corresponden a los anotados en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. El fabricante y el vendedor garantizan el contenido de materia activa especificando en la etiqueta, como eficaz en acción para lograr los resultados en ella señalados.



Categoría  
Tox. IV

**TOMAI LTDA.**

MISIONES 1442, ESC. 006 TEL.: 2915 32 28 FAX.: (598)2916 33 41  
C.P. 11000 - P.O. BOX 6610 - MONTEVIDEO - URUGUAY